

# A kézhigiéne 5 momentuma


## Fókuszban a centrális vénás katéteres páciens

Közvetlenül bármilyen katéterrel és a hozzá tartozó intravénás rendszerrel történő manipuláció előtt, mint pl:

**2a.** Katéter behelyezés (a steril kesztyű felvétele előtt) vagy kivétel (a tiszta, nem steril kesztyű felvétel előtt), kötőcsere, vérvétel, vagy az említett folyamatokhoz szükséges eszközök előkészítése.

**2b.** A infúziós szett vagy tartozékainak megnyitása.

**2c.** Infúzióba adandó gyógyszer előkészítése.



### Centrális vénás katéterek - további kulcs szempontok

- 1. Indikáció:** Csak indikáció esetén helyezzen be centrális vénás katétert. A szükségtelen katétert azonnal távolítsa el.
- 2. Behelyezés/ápolás/eltávolítás**
  - 2.1. Kerülje a femorális véna szúrását.
  - 2.2. Fertőtlenítse a szúrás helyét bőr fertőtlenítőszerrel (lehetőleg alkohol alapú 2%-os klórhexidin-glukonát).
  - 2.3. Alkalmazzon maximális steril izolációt szúrás közben (sapka, maszk, steril kesztyű, steril köpeny, nagyméretű steril betegizoláló textília).
  - 2.4. Cserélje a gézalapú kötőszert 2 naponta, az átlátszót 7 naponta, illetve bármelyiket azonnal, amennyiben szennyeződik.
  - 2.5. Vér, vérkészítmény, kemoterápia és zsírolat alkalmazása esetén a szerelék 24 órán belül cserélendő. Egyéb oldat adagolása esetén a szerelék 96 óránként cserélendő.
  - 2.6. Alkalmazzon érintés nélküli aszeptikus technikát minden katéterrel történő manipulációhoz.
  - 2.7. Alkalmazás előtt fertőtlenítse legalább 15 másodpercig a befecskendezési pontokat alkohol alapú klórhexidines oldattal.
- 3. Monitorozás:** Rögzítse a katéter behelyezése, eltávolítása, kötőcseréjére vonatkozó dátumot és időpontot, és naponta a szúrás helyének megtekintésére vonatkozó információkat.

