

HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS

Kedves Szülők!

Segítséget szeretnénk adni Önöknek ahhoz, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni a HPV elleni védőoltás beadatásáról.

A HPV, azaz a humán papilloma vírus egy olyan kórokozó, mely leggyakrabban szexuális úton terjed, mind a nők, mind a férfiak körében.

A vírusnak több típusa van, ezeket két fő csoportba sorolják: vannak köztük magas és alacsony kockázatúak. A magas kockázatú típusok tartós jelenléte felelős bizonyos rosszindulatú daganatok kialakulásáért. Ilyen, nagy rizikójú HPV-típusok okozzák a méhnyakrákok 99–100%-át.

A méhnyakrák kialakulása védőoltással és rendszeres szűrésekkel nagyrészt kivédhető!

A HPV elleni védőoltás a szexuális élet megkezdése előtt beadva a leghatékonyabb.

Erről az önkéntes, ingyenesen igényelhető oltásról a szülőknek/gondviselőknek kell szeptember elején írásban nyilatkozniuk.

Javasoljuk, hogy gyermekükkel együtt beszéljenek erről a témáról, így hozzák meg a döntést az oltás beadásáról!

Pár oldalban összegyűjtöttük Önök számára a legfontosabb információkat, a leggyakoribb kérdéseket, tévhiteket a HPV-fertőzéssel és a védőoltással kapcsolatban.

TÉVHITEK A HPV-FERTŐZÉSRŐL



Az immunrendszer magától is megtanul védekezni a HPV ellen.

NEM IGAZ!

Fontos tudni, hogy a HPV-vel szemben egy korábban leküzdött fertőzés után nem alakul ki tartós védetség, így ugyanazt a HPV-típust többször is el lehet kapni, akár ugyanattól a partnertől is.



A monogám kapcsolatban élőket nem veszélyezteti.

NEM IGAZ!


Sajnos a fertőzés egyetlen partnertől is elkapható, aki egy korábbi kapcsolatában fertőződött, és nem is sejtí, hogy megfertőzheti a másikat.



Óvszer használatával a későbbiekben is kivédhető a fertőzés.

NEM IGAZ!

Mivel a HPV bőr- és nyálkahártya-kontaktus útján terjed, így az intim pillanatok során bármikor elkapható.



Csak a nőket betegítheti meg.

NEM IGAZ!

A HPV a férfiakat is veszélyezteti, hisz a vírusos nemi szemölcsök náluk is jelentkezhetnek; és a HPV a kutatások szerint más, a férfiakat is érintő ráktípusok, pl. a fej-nyaki régió, a hímvessző és a végbélnyílás daganatainak kialakulásában is szerepet játszik.





Mikor és milyen oltást kapnak a lányok?

A 2014-ben bevezetett HPV elleni önkéntes védőoltást azok a lányok kaphatják meg iskolai kampányoltás keretében ingyenesen, akik betöltötték a 12. életévüket, és az általános iskola 7. osztályát végzik, függetlenül attól, hogy ki a fenntartója az intézménynek, ahová járnak. A vakcinát a felkarba adja be az iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség 5 hónap különbséggel. Az oltást írásban, a tanév elején kiosztott beleegyező nyilatkozaton lehet igényelni. Az iskolaorvos és a védőnő figyel arra is, hogy van-e az oltás beadásának a gyermek esetében bármiféle ellenjavallata.

Az iskolai kampányoltás során a kilenckomponensű oltóanyagot igényelhetik a szülők. Ez a jelenleg elérhető legtöbbféle HPV-komponenset tartalmazó oltóanyag, mely összesen kilenc HPV-típus ellen alakít ki védettséget. Ezek közül hét méhnyakrákot okozhat. A kilenckomponensű védőoltás várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek a méhnyakrákos esetek kb. 90%-át okozzák.

Az oltóanyagban található további kétféle HPV-komponens a nemi szemölcsök kialakulásáért felelős HPV-típus ellen hat, így a védőoltással megelőzhető a HPV okozta nemi szemölcsök kb. 90%-a is.

Több településen önkormányzati finanszírozás keretében az ott állandó lakhellyel rendelkező 7. osztályos fiúk számára is igényelhetik már a szülők az ingyenes oltás beadását.



Miért 7. osztályos korban kapják meg a lányok az ingyenes védőoltást?

Az oltás hatékonysága függ attól, hogy hány éves korban adják be. A legnagyobb hatékonyságot a szexuális élet megkezdése előtti, 10-15 éves korú lányok és fiúk esetén bizonyították. Az újabb klinikai vizsgálatok igazolják, hogy szexuálisan már aktív lányoknál és felnőtt nőknél is hatásos a védőoltás, függetlenül attól, hogy korábban volt-e HPV-fertőzésük vagy nem. Az ő esetükben az oltás nem ingyenes.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HPV ELLEN



Mi ellen véd, milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcina?

Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot, ezáltal a szervezetünk sikeresen kivédheti a fertőzést. A HPV elleni védőoltás tehát meg tudja előzni a tartós fertőzést a vírus azon típusai esetében, amelyek fehérje-komponensei megtalálhatók a vakcinában.

A HPV-oltóanyagok bizonyos daganatos megbetegedések és rákmegelőző állapotok elsődleges megelőzésére szolgálnak, azonban a meglévő HPV-fertőzést vagy a HPV okozta nemi szervi szemölcsöket, daganatokat megszüntetni, meggyógyítani már nem képesek.



Biztonságos-e az oltóanyag?

Az oltóanyag nem tartalmaz sem élő vírust, amely szaporodhatna a szervezetben, sem genetikai anyagot, amelyek a sejtekbe beépülve megváltoztathatná azok működését. Az oltásban a HPV-nek csak egy részecskéje, az ún. fehérjeburok van benne, ez biztosítja, hogy az immunrendszerünk védekezést tudjon kialakítani.

A HPV örökítőanyaga, azaz a DNS-e nincs benne a védőoltásban, emiatt az oltás nem okozhat daganatos betegséget.



NI VÉDŐOLTÁSRÓL (FORRÁS: WWW.ANTSZ.HU)



Milyen mellékhatásai lehetnek a védőoltásnak?

A védőoltás mellékhatása lehet néhány napig fennálló karfájdalom, láz, fejfájás.

A védőoltással összefüggésbe hozható súlyos mellékhatást eddig nem tapasztaltak.

Világszerte több mint 100 millió adag HPV-vakcinát adtak már be.

A mellékhatások jelentése az egészségügyi szakemberek kiemelt feladata.

Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltással járó esetleges kellemetlenség jóval kisebb kockázat, mint amit a védőoltás hiányában esetleg kialakuló daganatos megbetegedés jelenthet!



Mennyi ideig nyújt védelmet a HPV elleni vakcina?

Kutatások szerint a HPV elleni védőoltás hosszantartó védeettséget nyújt, emlékeztető oltás szükségessége eddig nem igazolódott.



Mi a helyzet, ha a szülő és a gyermek nem ért egyet a védőoltás szükségességével kapcsolatban?

A HPV elleni védőoltás önkéntes. Kiskorú esetében a választható védőoltásokról mindig a szülő/gondviselő dönt. Véleménykülönbség esetén mindenképp érdemes nyíltan beszélni egymással, meghallgatni a másik érveit. Szükség esetén a házi (gyermek)orvos, az iskolaorvos vagy az iskolavédőnő is segítséget tud nyújtani a döntéshez a részletes tájékoztatással.



Az oltás beadása után is kell majd nőgyógyászati szűrővizsgálatra járni?

Természetesen IGEN! Egyrészt a védőoltás a HPV-nek csak az említett 9 típusa által előidézett fertőzések ellen véd. Ritkán ugyan, de olyan HPV-típusok is okozhatnak daganatos megbetegedést, amelyek ellen nem nyújt védelmet a védőoltás. A szűrővizsgálat azért is fontos, hogy időben felismerjék, ha bármilyen más kóros folyamat indult el a női nemi szervek területén. A kezelés időben történő megkezdése ugyanis mindig nagyobb esélyt jelent a gyógyulásra!

Nagyon fontos, hogy HITELES forrásból származó, tudományosan is alátámasztott tényeket vegyék alapul, és ne az interneten terjedő, bizonytalan forrásból származó információkat!

És kérjük, a későbbiekben se feledjék:

A HPV elleni védőoltás, a nem túl korai életkorban megkezdett, felelősségteljes szexuális élet, továbbá a szexuális élet megkezdése után – a rendszeres méhnyakszűrés EGYÜTT nyújtja a lehető legteljesebb védelmet a méhnyakrák ellen!

További információ:

hpvdoktor.hu

malyvavirag.hu

A tájékoztató megjelenését az MSD Pharma Hungary Kft. tette lehetővé.

*A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdesse meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!*

Hivatkozások:

Sabeena S., Bhat P., Kamath V. et al., Possible non-sexual modes of transmission of human papilloma virus, J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 43, No. 3: 429–435, March 2017

Kásler M. A humán papilloma vírus okozta megbetegedések, megelőzésük lehetőségei és ennek népegészségügyi előnyei. Orvosi Hetilap Supplementum, 2012. december

<https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm>

https://www.antsz.hu/data/cms92651/VML2019_NNK_2019_05_08.pdf

Gardasil9 alkalmazási előírás www.ogyei.hu

www.cdc.gov/hpv/parents/vaccinesafety.html



MSD Pharma Hungary Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III., 3. emelet

Tel.: +36 1 888 5300

Kód: HU-NON-00071, Lezárás dátuma: 2019.08.01.

OGYÉI engedély szám: OGYÉI/47281-2/2019

